

HEPATOREN

Complemento dietético

HEPATOPROTECTOR
DIURÉTICO



- Ponedoras: Esteatosis hepática. Síndrome hemorrágico.
- Pollo de engorde: Esteatosis hepática. Mycotoxicosis.

HEPATOREN

ALIMENTO COMPLEMENTARIO EN FORMA DE SOLUCIÓN ORAL



COMPOSICIÓN POR LITRO

L-Carnitina clorhidrato	50 g
DL-Metionina	15 g
L-Lisina monoclorhidrato	10 g
Colina (cloruro)	50 g
Vitamina B12	10 mg
Manitol	65 g
Cloruro de sodio	100 g
Cloruro de potasio	75 g
Sorbitol	100 g

L-Carnitina es un factor fundamental en la movilización, transporte, oxidación y excreción de ácidos grasos, actividad reforzada por la presencia de Lisina, Metionina y Colina.

La Vitamina B12 tiene un papel vital en el metabolismo de los ácidos grasos para el mantenimiento de la mielina, así como en la formación de los glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema nervioso.

Las sales de Sodio y Potasio, junto a Manitol y Sorbitol le confieren propiedades diuréticas, facilitando la eliminación de los metabolitos resultantes de la actividad hepática.

INDICACIONES

Formulación nutricional con propiedades hepatoprotectoras, diuréticas y reguladoras de la energía:

- **Hígado graso** hemorrágico en gallinas ponedoras.
- **Micotoxicosis** con afectación funcional de hígado y riñones.
- Aves enjauladas (sedentarias) y en **condiciones de estrés**.
- **Picos de alta producción** en ponedoras
- Después de la **muda**.
- **Esteatosis lipoidea** en pollos de engorde.
- **Post tratamiento con coccidiostáticos y otras medicaciones** que pueden afectar funcionalmente el hígado y los riñones.

POSOLOGIA Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Via oral en el agua de bebida.

Dosis general para todas las especies: 1 ml/L de agua de bebida para 5 días consecutivos.

• **Gallinas ponedoras:** 1 ml/L durante 5 días. Repetir el tratamiento cada 3-4 semanas, empezar en la semana 20-30 (edad).

• **Pollos de engorde:** 1 ml/L de agua de bebida durante 5 días. Repetir el tratamiento cada 2 semanas si es necesario, hasta la remisión total de los síntomas.

Después de tratamientos prolongados con antibióticos y coccidiostáticos, vacunas e intoxicaciones: 1 ml/L de agua de bebida durante 5 días.

PRECAUCIONES, TIEMPO DE ESPERA

HEPATOREN es bien tolerado por todas la especies de destino. No requiere tiempo de espera, producto de uso para nutrición animal.

Almacenar a una temperatura entre 8° y máximo 30 °C

PRESENTACIÓN

5 L
1 L



 **s.p.® veterinaria, s.a.**

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60
Teléfono +34 977 850 170* - Fax +34 977 850 405
43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com